



ENREGISTREMENT

E21. INFORMATION DU PATIENT SUR LA VACCINATION AVEC PFIZER

Vous venez d'être vacciné avec le vaccin Pfizer (Comirnaty®), vous trouverez ci-dessous les informations relatives à cette vaccination

Attention : Les documents de référence sont le [RCP](#) et la [notice d'information](#) du Vaccin Pfizer

INFORMATIONS SUR LA VACCINATION

Date de la première injection :

Date de la seconde injection :

- À réaliser dans un délai entre 21 à 49 jours après la première dose

Remarque : en cas de forte tension d'approvisionnement et afin de ne pas retarder la finalisation du schéma vaccinal dans les délais impartis il est possible que vous receviez une seconde dose avec un autre vaccin à ARNm (Moderna)

INFORMATIONS SUR LE VACCIN

- Le vaccin Pfizer (Comirnaty®) a obtenu une autorisation de mise sur le marché (AMM) en Europe le 21/12/2020. Il s'agit d'un vaccin à ARNm (à nucléoside modifié) contre la COVID-19.
- La sécurité de ce vaccin a été évaluée chez les personnes âgées de 12 ans et plus ayant participé à 2 études cliniques qui ont inclus 22 875 participants ayant reçu au moins une dose de Pfizer.
- Les effets indésirables ont été généralement d'intensité légère ou modérée et se sont résolus en quelques jours après la vaccination.
- Une moindre fréquence de la réactogénicité a été observée chez les sujets les plus âgés.
- A ce jour l'autorisation de vaccination avec le vaccin Pfizer dépend de chaque territoire. Ainsi, chaque pharmacien, avant de vacciner, s'est rapproché de l'Agence Régionale de Santé (ARS) de sa région pour obtenir l'autorisation de vacciner avec ce vaccin.

CONDUITE A TENIR EN CAS D'EFFETS INDESIRABLES

Consultez un médecin **en urgence** si vous présentez l'un des signes et symptômes suivants d'une réaction allergique :

- sensation d'évanouissement ou de tête qui tourne ;
- changements dans vos battements cardiaques ;
- essoufflement ;
- sifflement ;
- gonflement des lèvres, du visage ou de la gorge ;
- urticaire ou éruption cutanée ;
- nausées ou vomissements ;
- douleur à l'estomac

En cas de paralysie faciale, **prenez immédiatement contact** avec un professionnel de santé (médecin ou le 15) pour être pris en charge.

Comme tous les médicaments, le vaccin Pfizer (Comirnaty®) peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. La plupart des effets indésirables surviennent dans les 1 à 2 jours suivant la vaccination.

Ainsi, en cas d'apparition de tout autre symptôme ou en cas de doute, n'hésitez pas à en parler avec votre pharmacien qui saura vous conseiller et vous orienter.





ENREGISTREMENT

E21. INFORMATION DU PATIENT SUR LA VACCINATION AVEC PFIZER

L'enregistrement : principes

Dans un système qualité la traçabilité est une des composantes clefs pour garantir une surveillance des pratiques et permettre l'amélioration continue.

L'enregistrement est un document qui permet de conserver des données en lien avec les activités. Les données renseignées peuvent avoir plusieurs fonctions :

- Permettre le suivi dans le temps d'éléments essentiels au bon fonctionnement de l'officine,
- Vérifier la réalisation effective de certaines tâches,
- Permettre le relevé des incidents,
- Conserver un historique des activités,
- Servir de preuves pour répondre à des exigences réglementaires.

Commentaires pour un bon usage

Un modèle du recto de ce document est disponible et peut être directement imprimé : « Modèle information du patient sur la vaccination avec Moderna »

- Ce document possède trois usages :
 - Rassurer le patient sur la sécurité du vaccin Pfizer (Comirnaty®)
 - Noter la date de rendez vous pour la seconde injection
 - Informer la personne de la conduite à tenir en cas d'apparition de certains effets indésirables
- Au moment de remettre ce document :
 - Discuter de la conduite à tenir en cas de d'apparition d'effets indésirables
- Pour déclarer tout effet indésirable suspecté d'être en lien avec la vaccination, contactez directement le Centre régional de pharmacovigilance <https://ansm.sante.fr/page/liste-des-centres-regionaux-de-pharmacovigilance> dont vous dépendez ou connectez-vous sur le portail de signalement : https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil

RCP = « Résumé des Caractéristiques du Produit »

Références :

ANSM - [Comirnaty \(Pfizer & BioNTech\)](#)

[Stratégie de vaccination contre le SARS-CoV-2](#) – Place du vaccin à ARNm COMIRNATY® (BNT162b2)

[Stratégie de vaccination contre la Covid-19](#) - Place du vaccin à ARNm COMIRNATY® chez les 12-15 ans

[Avis n° 2021.0030/AC/SEESP du 29 avril 2021 de la HAS](#) relatif à la possibilité de réaliser un schéma vaccinal avec deux vaccins à ARNm de spécialités différentes dans des situations exceptionnelles ; [MINSANTE N°2021-70](#)

Répertoire des spécialités pharmaceutiques de l'ANSM : [fiche du vaccin Comirnaty](#)

[La stratégie vaccinale et la liste des publics prioritaires](#) – Vaccination pour le grand public

[DGS-URGENT N°2021-61](#) ;

[Effets indésirables du vaccin Comirnaty de Pfizer/Biontech](#): ce qu'il faut savoir

[Vaccins COVID-19 Moderna et Pfizer](#) : que faire en cas d'effets indésirables ?