



INFORMATION DU PATIENT SUR LA VACCINATION AVEC PFIZER

Vous venez d'être vacciné avec le vaccin Pfizer (Comirnaty®), vous trouverez ci-dessous des informations relatives à cette vaccination

Attention : Les documents de référence sont le [RCP](#) et la [notice d'information](#) du Vaccin Pfizer

INFORMATIONS SUR LA VACCINATION

Date de la première injection :

Date de la seconde injection :

- doit être réalisée selon un intervalle allant de 21 à 49 jours après la première dose pendant la période estivale
- doit être réalisée avec le même vaccin soit le vaccin Pfizer

INFORMATIONS SUR LE VACCIN

- Le vaccin Pfizer (Comirnaty®) a obtenu une autorisation de mise sur le marché (AMM) en Europe le 21/12/2020. Il s'agit d'un vaccin à ARNm (à nucléoside modifié) contre la COVID-19.
- La sécurité de ce vaccin a été évaluée chez les personnes âgées de 12 ans et plus ayant participé à 2 études cliniques qui ont inclus 22 875 participants ayant reçu au moins une dose de Pfizer.
- Les effets indésirables ont été généralement d'intensité légère ou modérée et se sont résolus en quelques jours après la vaccination.
- Une moindre fréquence de la réactogénicité a été observée chez les sujets les plus âgés.
- A ce jour l'autorisation de vaccination avec le vaccin Pfizer dépend de chaque territoire. Ainsi, chaque pharmacien, avant de vacciner, s'est rapproché de l'Agence Régionale de Santé (ARS) de sa région pour obtenir l'autorisation de vacciner avec ce vaccin.

CONDUITE A TENIR EN CAS D'EFFETS INDESIRABLES

Consultez un médecin **en urgence** si vous présentez l'un des signes et symptômes suivants d'une réaction allergique :

- sensation d'évanouissement ou de tête qui tourne ;
- changements dans vos battements cardiaques ;
- essoufflement ;
- sifflement ;
- gonflement des lèvres, du visage ou de la gorge ;
- urticaire ou éruption cutanée ;
- nausées ou vomissements ;
- douleur à l'estomac

En cas de paralysie faciale, **prenez immédiatement contact** avec un professionnel de santé (médecin ou le 15) pour être pris en charge.

Comme tous les médicaments, le vaccin Pfizer (Comirnaty®) peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. La plupart des effets indésirables surviennent dans les 1 à 2 jours suivant la vaccination.

Ainsi, en cas d'apparition de tout autre symptôme ou en cas de doute, n'hésitez pas à en parler avec votre pharmacien qui saura vous conseiller et vous orienter.

